

Calendario operativo per le Vaccinazioni dell'Adulto – Stagione Autunno-Inverno 2017/2018

Soggetti ≥65 anni

		2017		2018		
		Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
Coorte dei nati nel 1952 (soggetti di 65 anni nel 2017)	Mai vaccinati con PCV13		Flu + PCV13 ⁽¹⁾	PPSV23 ^(1,2) a distanza di almeno un anno <i>Nel corso della campagna antinfluenzale 2018-2019</i>		
				HZ		
Coorte dei nati ≤1951 (soggetti >65 anni nel 2017)	Già vaccinati con una dose di PCV13		Flu + PPSV23 ^(1,2)			
				HZ <i>A distanza di ≥4 settimane da PPSV23</i>		
Coorte dei nati ≤1951 (soggetti >65 anni nel 2017)	Mai vaccinati con PCV13		Flu + PCV13 ⁽¹⁾			
	Già vaccinati con una dose di PCV13		Flu			

- (1) La vaccinazione antinfluenzale rappresenta l'occasione più opportuna da privilegiare per l'offerta attiva della vaccinazione anti-pneumococcica.
- (2) Una dose di PPSV23. Se il soggetto è stato precedentemente vaccinato con PPSV23, una **sol**a dose di vaccino polisaccaridico deve essere somministrata ≥5 anni dopo.